

# Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 150 F - Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DUDN 35 00 28 0



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 2 - 16 février 1989

## COLZA

Charançon de la tige : *Premières captures*

## C O L Z A

L'apparition de nouvelles feuilles (stade C1) est notée dans pratiquement toutes les parcelles, par contre le début d'élongation de la tige (stade C2) est moins fréquent.

SITUATION : Ce vol a débuté vers le 11 février dans l'Yonne et le Chatillonnais. Il n'a pas encore été observé dans les autres zones.

## PRECONISATION :

Dans l'Yonne et Chatillonnais, assurer la protection insecticide en début de semaine prochaine. Pour intervenir, choisir une journée douce et ensoleillée favorable à l'activité des charançons.

Dans les autres zones, attendre notre prochain bulletin.

## C E R E A L E S

## DESHERBAGE

Compte tenu des conditions météorologiques actuelles, le désherbage anti-graminées (à l'exception de la folle avoine) est d'ores et déjà envisageable ou le sera prochainement.

Le tableau ci-après rappelle les produits utilisables suivant les situations rencontrées.

Des désherbages mixtes, avec des produits efficaces à basse température sur graminées et dicotylédones jeunes, peuvent aussi être envisagés (Athlet, Bifenix N, Quartz GT, Kéos...).

On veillera dans tous les cas à :

- éviter les conditions entraînant un risque de phytotoxicité :
  - . chute brutale de température dans les jours suivant l'application,
  - . racines de tallage dans une zone de sol soufflé,
  - . apport d'azote liquide ou roulage trop récent (délai de 8 à 15 jours nécessaire).
- respecter les bonnes conditions générales d'intervention (végétation sèche, pulvérisateur bien réglé, produit bien adapté, respect des doses par hectare...).

P. 2

# EFFICACITE DES ANTIGRAMINEES EN FONCTION DES STADES

## DE LA CULTURE ET DES ADVENTICES

VULPIN					RAY-GRASS					FOLLE AVOINE					PRODUITS	STADES D'APPLICATION POSSIBLES SUR LA CULTURE			
Levée	1 feuille	1 talle	Fin tallage	Déb. montaison	Levée	1 feuille	1 talle	Fin tallage	Déb. montaison	Levée	1 feuille	1 talle	Fin tallage	Déb. montaison		Mi-tallage	Fin tallage	Epi à 1 cm	1 à 2 noeuds
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A ACTION RACINAIRE chlortoluron isoproturon methabenzthiazuron metoxuron	-	-	-	-
→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		→	→	→	→
→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		→	→	→	→
→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		→	→	→	→
→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	A ACTION RACINAIRE ET FOLIAIRE mégaplus méganet	-	-	-	-
→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		→	→	→	→
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A ACTION FOLIAIRE Grasp Illoxan CE Puma Suffix 425	-	-	-	-
→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		→	→	→	→
→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		→	→	→	→
→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→		→	→	→	→